

EXTRATO HIPOSENSIBILIZANTE

Imunoterapia: É um tratamento hipossensibilizante específico prescrito pelo especialista em função do diagnóstico estabelecido para o paciente. O objetivo deste tratamento é reduzir ou prevenir sintomas alérgicos, através de estímulos antigênicos e consequente modificação do seu estado imunológico.

Extrato: O extrato hipossensibilizante pode ser aquoso, depot. Os frascos em suspensão podem apresentar aspecto turvo, com certa intensidade de cor, dependendo do tipo de extrato e concentração.

Dose, intervalo e duração do tratamento: O paciente deverá seguir as orientações quanto a dose, intervalo das aplicações, concentração e duração do tratamento.

Fases do tratamento: O tratamento é dividido em fase de indução e manutenção.

Conservação: Não é necessário refrigeração durante pequenos períodos (transporte). Para conservar por períodos prolongados, os frascos devem ser mantidos em geladeira, entre 2º e 8º C. **Não deve congelar.**

Contra-indicações: Processos imunológicos em que não é indicado o tratamento imunoterápico. Em caso de gravidez, deve ser consultado o médico especialista, pois em determinadas condições a imunoterapia não é aconselhável.

Reações secundárias: As reações secundárias são previsíveis, pois o tratamento imunoterápico é preparado com os mesmos alérgenos aos quais o indivíduo é sensível. Em geral, estas reações se devem à administração errônea do tratamento ou técnica incorreta de aplicação.

Prevenção das reações secundárias: É de suma importância que a administração deste procedimento seja feita por pessoa qualificada e sempre sob supervisão médica. A aplicação em local que possua material para tratamento de urgência e droga como a epinefrina (adrenalina) diminui os riscos de reações fatais (raros) desta terapia. É fundamental o acompanhamento periódico do paciente e seguir todas as orientações feitas pelo médico.

Como utilizar epinefrina (Adrenalina 1/1.000): Indicado somente para os casos de reação grave à imunoterapia. Administração subcutânea na dose de 0,01 mL/kg/dose para criança, até a dose máxima do adulto que é de 0,3 mL, podendo ser repetida a cada 15 minutos, até um máximo de três vezes.

Norma para a correta administração: O tratamento deve ser iniciado pelo frasco mais diluído, de acordo com a indicação do médico especialista, verificando se o frasco contém a concentração indicada. A concentração, as doses e os intervalos de cada aplicação devem seguir orientação do médico prescritor. O tratamento de manutenção deve ser realizado com a dose máxima tolerada pelo paciente ou fração da mesma, segundo indicação expressa do especialista.

Esquema de administração: Esta caderneta sugere um esquema de administração, porém o especialista poderá prescrever seu próprio esquema de administração ou utilizar o mesmo e acrescentar doses intermediárias nas linhas em branco ou modificá-lo de maneira especial a cada paciente (coluna: dose aplicada).

EXTRATO ALERGÊNICO - INDUÇÃO

Aquoso Depot

composição

concentração

FRASCO Nº

Aplicar por via subcutânea profunda, com seringa tipo insulina/tuberculina de 1 mL e agulha curta e fina 10x5 ou 13x4,5 mm, a intervalos de dias.

DATA DA APLICAÇÃO	DOSES RECOMENDADAS	DOSES APLICADAS	APLICADOR
	0.10 ml		
	0.20 ml		
	0.30 ml		
	0.40 ml		
	0.50 ml		
	0.60 ml		
	0.70 ml		
	0.80 ml		